

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 140 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 00 28 D



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 27 - 22 octobre 1987

COLZA

Charançon du bourgeon terminal : Attendre

CEREALESPucerons et JNO : *Toujours peu de pucerons, mais surveiller***SUR MINTEL**

Vous pourrez aussi consulter
les Avertissements Agricoles du S.R.P.V.
Bourgogne



Pour obtenir les Avertissements télématiques
APPELEZ le 36-15
CODE EDIMK

COLZA

La situation hétérogène décrite la semaine dernière se maintient, voire s'accroît. En effet dans les parcelles et dans les zones où les pieds sont au stade 1-2 feuilles, l'évolution de la végétation apparaît plus lente que pour les pieds au stade 5-6 feuilles.

GROSSE ALTISE - CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

Absence de capture pour ces deux ravageurs.

Ne pas envisager de traitements insecticides dans l'immédiat ; attendre le prochain bulletin.

Les journées ensoleillées sont favorables à des arrivées de charançons dans les parcelles.
Surveiller les cuvettes.

CEREALES D'HIVER

Perturbée par les conditions météorologiques, la mise en place des semis se poursuit. Les conditions de levée sont bonnes. Les semis réalisés autour du 1er octobre atteignent le stade 2 feuilles. Quelques semis antérieurs ont atteint le stade 3 feuilles.

PUCERONS et JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE**SITUATION :**

Peu de pucerons sont actuellement visibles sur les parcelles, les plus fortes fréquences observées ne dépassent pas 5 %, sauf pour la vallée de la Vingeanne où des fréquences atteignant parfois 20 % ont pu être notées.

Par ailleurs, les maïs portent assez peu de pucerons. Les repousses de céréales sont très faiblement colonisées. Les sources locales de pucerons sont donc peu importantes.

PRECONISATION :

Compte tenu de l'époque, les risques de colonisation rapide se réduisent.

Surveiller les parcelles. Ne pas intervenir avant d'avoir atteint 10 à 15 % de pieds portant au moins un puceron.

Sauf situations particulières, il est possible qu'un traitement ne soit pas nécessaire cet automne.

*

*

*

P41

